

# 1<sup>ο</sup> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## “Επίκαιρα θέματα στην Καρδιολογία”

5 & 6 Απριλίου  
2024

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/4**  
Πανεπιστήμιο  
Δυτικής  
Μακεδονίας  
(Αμφιθέατρο  
κτιρίου Διοίκησης, ΖΕΠ)

**ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4**  
Κοβεντάρειος  
Δημοτική  
Βιβλιοθήκη  
Κοζάνης

## Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ



ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



# Sanocard®

Φλεκαϊνίδη οξική

Μακροχρόνια διατήρηση του ρυθμού  
με 1 δόση ημερησίως



**ΠΕΡΙΓΡΗΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**  
**1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Sanocard 100 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά & Sanocard 200 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΙΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε καψάκιο περιέχει 100 ή 200 mg φλεκαϊνίδης οξικής. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Θεραπευτικές ενδείξεις: Αντιταχυκαρδία για: 1. Καρδιακή παλινδρομική ταχυκαρδία, αρρυθμίες που σχετίζονται με το σύνδρομο Wolff-Parkinson-White και συγγενείς παθήσεις με παραπληρωματικά δρόμια, στις περιπτώσεις που άλλες μορφές αγωγής κρίθηκαν μη αποτελεσματικές. 2. Σκληρή συμπτωματική και ασυμπτωτική για τη ζωή παροξυσμική κοιλιακή αρρυθμία, η οποία δεν ανταποκρίθηκε στις άλλες μορφές θεραπείας. Στις περιπτώσεις επίσης που άλλες αγωγές δεν ήταν ανεκτές. 3. Παροξυσμικές κοιλιακές αρρυθμίες (κοιλιακή μαρμαρυγή, κοιλιακές πτερυγιστές και κοιλιακή ταχυκαρδία) σε ασθενείς με συμπτωματα αντοχής ύστερα από αντίταξη. Δεδομένου ότι υπάρχει αντικρουστική ανάγκη αγωγής βάσει της σοβαρότητας των κλινικών συμπτωμάτων, σε περιπτώσεις που άλλες αγωγές κρίθηκαν μη αποτελεσματικές. Οι πρέπει να υπάρχει αποδέσμευση της οργανικής καρδιακής νόσου και η της διατηρημένης λειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Άλγος που αυξημένου κινδύνου για προοδευτικές επιπλοκές. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Η έναρξη της θεραπείας με φλεκαϊνίδη οξική, καθώς και οι αλλαγές στη δόση θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό στενή επίβλεψη και παρακολούθηση των ΗΚΓ και των επιπέδων του πλάσματος. Ενήλικες και γηρά (ηλικίας 13-17 ετών): Υπερκοιλιακές αρρυθμίες: Η συνιστώμενη δοσολογία έναρξης είναι 100 mg ανά ημέρα. Το ενδεδειγμένο εύρος της δόσης μπορεί να εξεταστεί ύστερα από μία περίοδο 4 έως 5 ημερών. Η βέλτεστη δόση είναι 200 mg ανά ημέρα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, είναι εφικτή η αύξηση της δόσης στη μέγιστη δυνατή ποσότητα των 300 mg ανά ημέρα. Καρδιακές αρρυθμίες: Η συνιστώμενη δοσολογία έναρξης είναι 200 mg ανά ημέρα. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 400 mg και χρησιμοποιείται συνήθως σε μεγετούμενες ασθενείς ή σε περιπτώσεις που απαιτείται γρήγορος έλεγχος της αρρυθμίας. Τρόπος χορήγησης: Προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα επιπλοκών των τρώων στην απορρόφηση του φαρμάκου, η λήψη της φλεκαϊνίδης θα πρέπει να πραγματοποιείται με άδειο στομάχι ή με ώρα πριν από το φαγητό. **Αντενδείξεις:** Η χρήση της φλεκαϊνίδης αντενδείκνυται στην περίπτωση καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς και στην περίπτωση ασθενών με ύπαινο κυκλοστάτο του μεσοεμβρίου οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτωματική κοιλιακή έκταση ή συμπτωματική μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία. Ασθενείς που παρουσιάζουν χρόνια κοιλιακή μαρμαρυγή, στην περίπτωση των οποίων δεν έγινε καμία προσπάθεια αντιμετώπισης με φλεβοκατακόρυφο. Ασθενείς με μειωμένη ή διαταραγμένη κοιλιακή λειτουργία, καρδιακή καταικτίλη, σοβαρή βρογχίτιδα (μερική από 50 bpm), σοβαρή υπόταση. Χρήση σε συνδυασμό με το αντιαρρυθμικό τάξ (τοπικαϊνίδης δικλίου νατρίου). Σε ασθενείς με αρρυθμιακά σημαντική βοληδίκη καρδιακή νόσο. Γνωστό σύνδρομο θυρεοειδούς. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η αγωγή με από του στόματος φλεκαϊνίδη θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη νοσοκομειακής μονάδας ή άλλου σε ασθενείς με: «Κολποκοιλιακή (AV) κοιλιακή παλινδρομική ταχυκαρδία, αρρυθμίες που σχετίζονται με το σύνδρομο Wolff-Parkinson-White και συγγενείς παθήσεις με παραπληρωματικά δρόμια. - Παροξυσμική κοιλιακή μαρμαρυγή στην περίπτωση ασθενών που παρουσιάζουν συμπτώματα αντοχής. Η φλεκαϊνίδη, όπως τα άλλα αντιαρρυθμικά, ενδέχεται να προκαλέσει προοδευτικές επιπλοκές. Όπως και τα άλλα αντιαρρρυθμικά, η φλεκαϊνίδη μπορεί να επηρεάσει το εγκεφαλικό. Ενδέχεται να υπάρχει επίδραση της υπέρτασης αρρυθμίας ή ευφάντασης νέας. Ο κίνδυνος προοδευτικών επιπλοκών είναι πιο πιθανός στην περίπτωση ασθενών με οργανική καρδιακή νόσο και/ή σημαντική διαταραχή της αριστερής κοιλίας. Πολύ συχνές (≥ 1/10): (αλβανία, ζάλη και σκοτεινότητα, οι οποίες είναι συνήθως παροδικές, διαταραχή της όρασης όπως διπλωπία και βολή όραση). Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10): προοδευτική (πιο πιθανή στους ασθενείς με οργανική καρδιακή νόσο), δύσπνοια, οίδημα, κόπωση, πονοκέφαλος, αίσθημα δυσφορίας. **Α.Τ. 100 mg: 7,77 € Α.Τ. 200 mg: 11,56 €.**

**UNI-PHARMA**  
Pharmaceutical Laboratories

Βεβαιώστε να είναι το φάρμακο στο αρχικό και  
Αναφέρετε ΟΔΕΙ τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο φάρμακο.  
Συμπληρώστε την ΚΑΤΑΡΤΗ ΚΑΡΤΑ.





Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, στη συνεχή προσπάθειά της για τη μετάδοση επίκαιρης γνώσης και την ανταλλαγή νέων δεδομένων που αφορούν τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων επέλεξε φέτος την Κοζάνη για να διοργανώσει το 1ο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο 2024.

Το πολύπλευρο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι κλινικά προσανατολισμένο για να καλύψει τις ανάγκες όχι μόνο των Καρδιολόγων αλλά ευρύτερα όλων των ιατρών που υπηρετούν την Καρδιαγγειακή Ιατρική (Παθολόγοι, Γενικοί οικογενειακοί ιατροί, Νεφρολόγοι, Πνευμονολόγοι, κ.λπ.).

Παράλληλα με τις επιστημονικές δραστηριότητες, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θεωρεί ως υποχρέωσή της την υπεύθυνη πληροφόρηση του κοινού για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Στο πλαίσιο αυτό διακεκριμένοι Καρδιολόγοι, θα ενημερώσουν με εύληπτο τρόπο την τοπική κοινωνία για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα και θα πραγματοποιηθεί Σεμινάριο ΚΑΡΠΑ σε επαγγελματίες υγείας.

Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας (ΚΕΒΕ) για την αгаστή συνεργασία που είχαμε στην πραγματοποίηση του συνεδρίου.

Με τις σκέψεις αυτές, σας καλωσορίζουμε στο 1ο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο 2024, πεπεισμένοι ότι η ενεργός συμμετοχή σας θα συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία του Συνεδρίου.

**Γεώργιος Κοχιαδάκης**

Καθηγητής Καρδιολογίας

Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής ΠΑΓΝΗ

Πρόεδρος ΕΚΕ

## Χορηγοί Συνεδρίου



PMI SCIENCE  
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL



Pharmaceutical Laboratories S.A.

WinMedica



# Tormis

torasemide



Tormis ADV1 04/2021

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

ΑΘΗΝΑ: Οιδίνοδος 1-3 και Παράδρομος Αττικής οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι.  
Τηλ.: 210 7488821, Φαξ: 210 7488827, E-mail: [info@winmedica.gr](mailto:info@winmedica.gr)

[www.winmedica.gr](http://www.winmedica.gr)

 **WinMedica**  
Serving Health for Life

**14.00 – 17.00 ΚΑΡΠΑ σε υγειονομικούς**

---

Πρόεδρος – Συντονιστής: **Χ. Παρίσης**  
Ομάδα Εργασίας Καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης ΕΚΕ  
Συμμετέχει το **ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας**

**17.30 – 18.00 Στρόγγυλο Τραπέζι**

---

**Η στεφανιαία νόσος σε όλο το ηλικιακό φάσμα της ανθρώπινης ζωής: παιδική ηλικία, εφηβεία, ενήλικη ζωή**

Πρόεδροι: **Ι. Ζαρίφης** (Θεσσαλονίκη), **Γ. Μπομπότης** (Θεσσαλονίκη),  
**Χ. Τσεβεκίδης** (Κοζάνη)

Αγωγή καρδιαγγειακής υγείας από την παιδική ηλικία  
– **Σ. Μπακαϊμη** (Γρεβενά)

Προαθλητικός έλεγχος  
– **Ειρ. Κοκάνη** (Πτολεμαΐδα)

Εγρήγορση του πολίτη στα συμπτώματα της Στεφανιαίας νόσου  
– **Ι. Βλάχου** (Πτολεμαΐδα)

Δίκτυο Διαχείρισης και Διακίνησης Οξέων Στεφανιαίων Συνδρομών  
– **Ι. Βογιατζής** (Βέροια)

Σχολιαστές: **Δ. Τσιανάκας** (Κοζάνη), **Ε. Μπουντιούκος** (Κοζάνη),  
**Η. Τσιμανίδης** (Πτολεμαΐδα),  
**Ν. Κηπουρίδης** (Πτολεμαΐδα)

**18.30 – 19.00 Διάλεξη**

---

Πρόεδρος: **Γ. Κοχιαδάκης** (Κρήτη)  
Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος: διαχείριση στη χώρα μας  
σε Πολιτειακό επίπεδο  
– **Λ. Μιχάλης** (Ιωάννινα)

**19.00 – 20.00 Στρόγγυλο τραπέζι**

**Συννοσηρότητες, προδιαθεσιακοί παράγοντες στεφανιαίας νόσου**

**Οι γιατροί ενημερώνουν, οι πολίτες ερωτούν**

Πρόεδροι: **Δ. Βαλασιάδης** (Φλώρινα), **Ε. Κουλούρης** (Καστοριά),  
**Στ. Λαμπρόπουλος** (Κοζάνη)

Αρτηριακή Υπέρταση: Πόση μείωση και πώς;

- **Λ. Νάνης** (Φλώρινα)

Δυσλιπιδαιμία: Πόση μείωση και πώς;

- **Μ. Θωμά** (Καστοριά)

Σακχ. Διαβήτης: Πόση μείωση και πώς;

- **Π. Δοκόπουλος** (Καστοριά)

Κάπνισμα: διακοπή ή περιορισμός (υποκατάστατα)

- **Δ. Ελευθεριάδης** (Πτολεμαΐδα)

Σχολιαστές: **Ε. Μαδίκας** (Κοζάνη), **Χ. Κεσκελίδης** (Πτολεμαΐδα),

**Μ. Αγατζιώτης** (Πτολεμαΐδα), **Α. Σεμιζόγλου** (Κοζάνη)

**ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ**

**20.00 – 20.30 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ**

**Στ. Λαμπρόπουλος,**

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Κοζάνης

**Καθ. Γ. Κοχιαδάκης,** Πρόεδρος ΕΚΕ, Κοσμήτορας ΠΑΓΝΗ

**Ι. Ζαρίφης,** Πρόεδρος ΚΕΒΕ

**Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος**

**Γ. Αμανατίδης,** Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

**Π. Μπογιατζίδης,** Διοικητής 3ης ΥΠΕ

**Θ. Θεοδουλίδης,** Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

**Ι. Κοκκαλιάρης,** Δήμαρχος Κοζάνης

**Δ. Σιόλιος,** Διοικητής Νοσοκομείου Κοζάνης

**Χ. Τσεβεκίδης,** Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης

**Ε. Κωνσταντινίδης,** Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης

**Κήρυξη εργασιών του συνεδρίου**



**Απονομή τιμητικής πλακέτας στους**  
**Καθηγητή ΧΑΡΙΣΙΟ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑ**, τέως Πρόεδρο της Ελληνικής  
Καρδιολογικής Εταιρείας,  
Απονέμει ο **Καθ. Γ. Κοχιαδάκης, Πρόεδρος ΕΚΕ**  
**Καθηγητή ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ**, τέως Πρόεδρο της Ελληνικής  
Καρδιολογικής Εταιρείας,  
Απονέμει ο **Ιωάννης Ζαρίφης, Πρόεδρος της ΚΕΒΕ**  
**Καρδιολόγο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΤΤΑ**, τέως Διευθυντή Καρδιολογικού  
Τμήματος Νοσοκομείου Κοζάνης, απονέμει ο **Στ. Λαμπρόπουλος,**  
Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Κοζάνης

**20.30:**

**ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ**





# zateven

ezetimibe+atorvastatin



ZATEVEN ADV 01 01/2021

**9.00 – 10.30      Στρόγγυλο τραπέζι**

---

**Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών από τις καρδιολογικές κλινικές των νοσοκομείων της Δυτ. Μακεδονίας**

Πρόεδροι: **Ι. Βογιατζής** (Βέροια), **Σ. Παπαϊωάννου** (Αθήνα),  
**Κ. Παπαδόπουλος** (Αθήνα)

ΝΟΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ: **Π. Ροδίτης**

ΝΟΣ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ: **Δ. Ελευθεριάδης**

ΝΟΣ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ: **Κ. Τσιπτσής**

ΝΟΣ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: **Ε. Κουλούρης**

ΝΟΣ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ: **Δ. Βαλασιάδης**

ΝΟΣ. ΒΕΡΟΙΑΣ: **Α. Σαμαράς**

Σχολιαστές: **Α. Χρυσόχου** (Καστοριά),  
**Κ. Κουτσαμπασόπουλος** (Βέροια), **Ι. Ντάπσεβιτς** (Βέροια)

**10.30 – 12.00      Στρόγγυλο τραπέζι**

---

**Καρδιακή ανεπάρκεια: Από το Α στο Ω**

Πρόεδροι: **Κ. Νάκα** (Ιωάννινα), **Α. Στεφανίδης** (Αθήνα)

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με πρωτοδιαγνωσθείσα ΚΑ

- **Ι. Βλάχου** (Πτολεμαΐδα)

ΚΑ με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης

- **Ν. Κακκαβάς** (Φλώρινα)

Βέλτιστη αγωγή ΚΑ

- **Σ. Σωτηρίου** (Κοζάνη)

SGLT2is: Νέα εποχή στην διαχείριση ΚΑ ανεξάρτητα του ΕΦ

- **Α. Αβραμίδου** (Καστοριά)

Σχολιαστές: **Γ. Αργυροπούλου** (Κοζάνη), **Ε. Μακρυγιάννης** (Γρεβενά)

**12.00 – 12.30      Διάλειμμα**

---

**12.30 – 13.00      Διάλεξη**

---

Πρόεδροι: **Α. Ζιάκας** (Θεσσαλονίκη)

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ: Όταν η φαρμακευτική αγωγή δεν επαρκεί -  
Επεμβατική Αντιμετώπιση

- **Κ. Τσιούφης** (Αθήνα)

**13.00 – 14.30    Στρόγγυλο τραπέζι**

---

**Βαλβιδοπάθειες**

Πρόεδροι: **Ι. Στυλιάδης** (Θεσσαλονίκη),  
**Δ. Κετίκογλου** (Θεσσαλονίκη)

Μιτροειδής Βαλβίδα: Αξιολόγηση, πότε παραπέμπω;

- **Ευστ. Παγκουρέλιας** (Θεσσαλονίκη)

Τριγλωχίνα Βαλβίδα: Αξιολόγηση, πότε παραπέμπω;

- **Β. Σαχπεκίδης** (Θεσσαλονίκη)

Αορτική Βαλβίδα: Η TAVI Γίνεται 20 Χρονών. TAVI Η SAVR;

- **Α.Δ. Μαυρογιάννη** (Θεσσαλονίκη)

Πρόγραμμα TAVI στα Δημόσια Νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος

- **Γ. Μπομπότης** (Θεσσαλονίκη)

Tricks & tips: στην υπερηχοκαρδιολογική εκτίμηση των βαλβιδοπαθειών

- **Κ. Στόκκος** (Κοζάνη)

Σχολιαστές: **Μ. Μπουγιακλή** (Θεσσαλονίκη)

**14.30 – 15.00    Διάλειμμα**

---

**15.00 – 16.30    Στρόγγυλο τραπέζι**

---

**Στεφανιαία νόσος**

Πρόεδροι: **Ν. Καυκάς** (Αθήνα), **Γ. Μπομπότης** (Θεσσαλονίκη)

Σταθερή στηθάγχη: Επανειμάτωση

- **Α.Δ. Μαυρογιάννη** (Θεσσαλονίκη)

Σταθερή στηθάγχη: Φαρμακευτική Αγωγή

- **Π. Ροδίτης** (Κοζάνη)

Τα πολλά πρόσωπα των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων:

Αυτόματος Διαχωρισμός των Στεφανιαίων Αγγείων

- **Μ. Μπουγιακλή** (Θεσσαλονίκη)

Πολυαγγειακή στεφανιαία νόσος: CABG Η PCI;

- **Κ. Θεοδωρόπουλος** (Θεσσαλονίκη)

Σχολιαστές: **Ε. Τριχάκη** (Καστοριά), **Σ. Θεοδωρίδου** (Κοζάνη)

**16.30 – 18.00    Στρόγγυλο τραπέζι**

---

**Αρρυθμίες / Ηλεκτροφυσιολογία**

Πρόεδρος: **Γ. Γιαννόπουλος** (Θεσσαλονίκη), **Σ. Σιδερής** (Αθήνα)

Διαστρωμάτωση Κινδύνου Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου  
σε Ασθενείς με ΚΑ

- **Σ. Σιδερής** (Αθήνα)

Κοιλιακή Αρρυθμία και ΚΑ: Πότε Χρειάζεται Κατάλυση;

- **Γ. Γιαννόπουλος** (Θεσσαλονίκη)

Ηλικιωμένοι και ΚΜ: Αντιπηκτικό ή Όχι;

- **Α. Αντωνιάδης** (Θεσσαλονίκη)

Κατάλυση ΚΜ: Νεότερα Δεδομένα

- **Λ. Μάντζιαρη** (Θεσσαλονίκη)

Σχολιαστές: **Σ. Μπακαϊμ** (Γρεβενά)

**18.00 – 19.30    Στρόγγυλο τραπέζι**

---

**Στεφανιαία νόσος**

Πρόεδροι: **Γ. Κοχιαδάκης** (Αθήνα), **Σ. Λαμπρόπουλος** (Κοζάνη)

Αξιολόγηση ασθενούς μετά από Επανειμάτωση:

Πότε να γίνεται και πώς;

- **Μ. Διδάγγελος** (Θεσσαλονίκη)

Γυναίκα ασθενής 58 ετών με αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, αιτιάται στηθάγχη και ο στεφανιογραφικός έλεγχος δεν αναδεικνύει κριτική αθηροσκληρυντική βλάβη. Διαγνωστικοί αλγόριθμοι και θεραπεία

- **Ν. Καυκάς** (Αθήνα)

Υπερτριγλυκεριδαιμία. Υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος

- **Α. Μαρέτη** (Αθήνα)

Ασθενής με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και λοίμωξη με COVID-19

- **Ε. Ιωαννίδης** (Θεσσαλονίκη)

**19.30 – 20.00    Διάλεξη**

---

Πρόεδρος: **Γ. Κοχιαδάκης** (Ηράκλειο)

Σύγχρονη θεραπεία της ΚΑ στην κλινική πράξη

- **Γ. Φιλιππάτος**

**20.00 – 20.30    Συμπεράσματα, Λήξη συνεδρίου**

---





# PLATOREL®

## Ροσουβαστατίνη



**ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**  
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,  
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300  
[www.elpen.gr](http://www.elpen.gr)

**ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**  
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,  
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731  
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,  
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη  
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,  
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς  
ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΠΡΟΪΟΝ	Λ. Τ.
PLATOREL F.C.TAB 5MG/TAB BTx30 tabs	6,58 €
PLATOREL F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 tabs	13,31 €
PLATOREL F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 tabs	18,75 €
PLATOREL F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 tabs	23,28 €

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.  
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

# *Eliquis*<sup>TM</sup> apixaban

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο  
δισκίο περιέχει 2,5 mg ή 5 mg apixaban.



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη  
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

**PFIZER Ελλάς Α.Ε.** Λεωφ. Μεσογείων 243, Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,  
Τηλ. Επικοινωνίας 210 67 85 800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000.

**PFIZER Ελλάς Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)** Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018,  
Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
**ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**  
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "Κίτρινη Κάρτα"

PP-ELI-GRC-0923-JAN23